



Gaio. Adulto (31-VII).

GAIO (*Garrulus glandarius*)

IDENTIFICAÇÃO

32-34 cm. Plumagem de cor acastanhada; abdómen claro; coroa estriada de preto e branco; asas escuras com álula e coberturas azuis listadas de negro; coberturas caudais brancas.



Gaio. Imagem da cabeça e coberturas das primárias.



ESPÉCIES SIMILARES

Não é possível de confundir com nenhuma outra espécie.

SEXO

Sexos semelhantes em termos de plumagem. O tamanho pode separar alguns exemplares extremos: **macho** com asa > 190 mm; **fêmea** com asa < 174 mm.

IDADE

Reconhecem-se 3 classes de idade:

Juvenis semelhantes aos **adultos**, no entanto com pouco branco na cabeça; sem estriado na fronte; cores esbatidas; plumagem nova.

1º ano Outono/2º ano Primavera com a grande cobertura mais externa com menos de 8 barras negras; barras negras das penas azuis repartidas com muita irregularidade; se houver limite de muda nas grandes coberturas, as de juvenil retidas são mais curtas; se mudou todas as grandes coberturas, há diferença no desenho do barrado destas e no das coberturas primárias; penúltima pena mais externa da cauda < 25 mm de largura a 40 mm da ponta.

Adultos com a grande cobertura mais externa com mais de 10 barras negras; barras negras das penas azuis repartidas com regularidade; não há limite de muda nas grandes coberturas; o desenho do barrado das grandes coberturas e das grandes coberturas primárias é semelhante; a penúltima pena mais externa da cauda > 25 mm de largura a 40 mm da ponta.




Gaio. Determinação da idade. Número de barras negras na grande cobertura mais externa: esquerda adulto; direita juvenil.



Gaio. Determinação da idade. Regularidade no desenho das barras negras nas grandes coberturas primárias: em cima adulto; em baixo juvenil.

coberturas e terciárias; terminada em fins de Agosto e Outubro.



Gaio. Extensão da muda pós-juvenil.

FENOLOGIA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUTO EM PORTUGAL

Espécie residente.



Gaio. Determinação da idade. Largura da penúltima pena mais externa da cauda; esquerda adulto; direita juvenil.

MUDA

Muda **pós-nupcial** completa, que geralmente está terminada em meados de Outubro. A muda **pós-juvenil** é parcial, incluindo as penas corporais, pequenas e médias coberturas e grandes coberturas internas, estendendo-se em alguns exemplares a todas as grandes



Gaio. 2º ano ().



Gaio. Juvenil (31-VII).



SEM
IMAGEM



SEM
IMAGEM



Gaio. Imagem da cabeça e cor da íris: em cima esquerda adulto (31-VII); em cima direita 2º ano (); esquerda juvenil (31-VII).




Gaio. Imagem do peito: em cima esquerda adulto (31-VII); em cima direita 2º ano (); esquerda juvenil (31-VII).



SEM
IMAGEM



SEM
IMAGEM



Gaio. Imagem da coroa: em cima esquerda adulto (31-VII); em cima direita 2º ano (); esquerda juvenil (31-VII).



Gaio. Imagem do dorso: em cima à esquerda adulto (31-VII); em cima à direita 2ºano(); esquerda juvenil (31-VII).

Gaio

SEM
IMAGEM

SEM
IMAGEM



Gaio. Imagem da cauda e largura da 5ª pena: em cima à esquerda adulto (); em cima à direita 2º ano (); esquerda juvenil (31-VII).



Gaio. Adulto: imagem do listrado das penas azuis da asa (31-VII).



Gaio. Juvenil: imagem do listrado das penas azuis da asa (31-VII).



SEM
IMAGEM



Gaio. Adulto: imagem da asa (31-VII).



Gaio. Número de barras negras na grande cobertura mais externa: em cima à esquerda adulto (31-VII); em cima à direita 2º ano (); esquerda juvenil (31-VII).



Gaio. Juvenil: imagem da asa (31-VII).